

様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成 23 年 3 月 31 日現在

機関番号 : 34419

研究種目 : 基盤研究 (B)

研究期間 : 2008 ~ 2010

課題番号 : 20390269

研究課題名 (和文) 造血幹細胞の細胞内代謝・増殖・分化制御と白血病原因遺伝子が及ぼす影響に関する研究

研究課題名 (英文) Roles of leukemogenic oncogenes in the regulation of metabolism, growth, and differentiation of hematopoietic stem cells

研究代表者 :

松村 到 (MATSUMURA ITARU)

近畿大学・医学部・教授

研究者番号 : 00294083

研究成果の概要 (和文) :

1. RUNX1のC末端の変異体がGadd45aの発現を抑制してDNA修復能を低下させることを見出した。
2. FIP1L1-PDGFRαが造血幹細胞からの好酸球系前駆細胞(EoP)の発生を増加させるのみでなく、他の系統の前駆細胞からもEoPを産生させることを明らかにした。
3. BCR-ABLおよびその下流のRas/MAPKが骨髄系細胞を増殖させる一方で、p21^{WAF1}を介して赤血球造血を抑制することを見出した。

研究成果の概要 (英文) :

1. The C-terminal deletion mutant of *RUNX1*, RUNX1dC, attenuates DNA-damage repair responses to UV irradiation in murine c-KIT⁺Sca-1⁺Lin⁻ cells by suppressing the expression of *Gadd45a*.
2. FIP1L1-PDGFRalpha not only enhanced the development of eosinophil progenitors (EoPs) from KSL cells but also aberrantly developed EoPs from progenitors in other lineages.
3. BCR-ABL inhibited erythropoiesis through the induction of p21^{WAF1} via Ras/MAPK, while it promoted granulopoiesis.

交付決定額

(金額単位 : 円)

	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	5,400,000	1,620,000	7,020,000
2009 年度	4,800,000	1,440,000	6,240,000
2010 年度	4,100,000	1,230,000	5,330,000
年度			
年度			
総 計	14,300,000	4,290,000	18,590,000

研究分野 : 医歯薬学

科研費の分科・細目 : 内科系臨床医学・血液内科学

キーワード : 造血幹細胞、遺伝子変異、慢性骨髄性白血病、活性型チロシンキナーゼ、増殖シグナル

1. 研究開始当初の背景

白血病の起源となる白血病幹細胞 (Leukemic Stem cell, LSC) は、多くの場合 CD34⁺CD38⁻

の造血幹細胞レベルの未分化な細胞である。白血病の原因となる遺伝子異常はこの造血幹細胞レベルの細胞に起こるが、どのような

機構で白血病のそれぞれの病型を規定するのかは明らかにされていない。また、細胞、特に造血幹細胞の増殖・分化・生存においては細胞外のグルコース濃度、細胞内ATP量などのエネルギー代謝が重要な役割を担うと考えられているが、その制御機構の詳細は明らかではない。

2. 研究の目的

本研究では、白血病原性遺伝子が造血幹/前駆細胞の増殖・生存・自己複製におよぼす影響を検討するとともに、造血器腫瘍の病型決定機構を明らかにすることを目的とした。


3. 研究の方法

野生型マウスおよび癌抑制遺伝子（*p16^{INK4A}*、*p19^{ARF}*、*p16^{INK4A}/p19^{ARF}*ダブル、*p53*）欠損マウスの造血幹細胞分画を含め *c-KIT⁺Sca-1⁺Lin⁻*細胞 および 各種 前 駆 細 胞 (KSL, CMP, GMP, MEP, CLPなど)に白血病化に関わる転写因子の変異体 *RUNX1* の C 末端の変異 (*RUNX1dC*)、恒常的活性型チロシンキナーゼ *FIP1L1-PDGFRα* (F/P)、*BCR-ABL*などを導入し、ゲノムの安定性、細胞の増殖・生存、系統決定がどのように影響されるのかを検討した。

4. 研究成果

(1) *RUNX1*変異体の機能解析

急性骨髄性白血病(AML)や骨髄異形成症候群(MDS)の一部において認められる*RUNX1*のC末端の変異(*RUNX1dC*)をマウスのKSL細胞に導入したところUVやγ線の照射前後におけるDNAの2重鎖障害をあらわすヒストンA2AXのリン酸化が増強した。



*RUNX1dC*導入とMock導入細胞におけるDNA損傷の修復に関する遺伝子の発現変化をスク


リーニングしたところ*Gadd45a*の発現低下が認められた。

この細胞に*Gadd45a*を発現させるとDNA修復能が回復した。また、マウスの未熟な造血細胞に*RUNX1dC*を導入しても*Gadd45a*の発現が


**Fold differences of gene expressions
(32D-RUNX1dC/32D-neo)**

<i>Gadd45a</i>	0.22
<i>Rad51</i>	0.40
<i>Rad17</i>	0.41
<i>Dclre1a</i>	0.49

低下した。さらに、野生型*RUX1*が*Gadd45a*のイントロン3に存在する*RUNX1*結合配列を介して、*Gadd45a*の転写を制御していることをクロマチン免疫沈降法、ルシフェラーゼアッセイを用いて明らかにした。



実際、*RUNX1-dC*を有するAML、MDS症例においては、コントロールの健常人、本変異を有さないMDS症例と比較して*Gadd45a*の発現低下が認められることも明らかとなった。




これらの結果から、*RUNX1dC*の変異はDNA修復能を低下させ、二次的な遺伝子異常の誘因になることが明らかとなった
(Leukemia, revise中)。

(2) *FIP1L1-PDGFRα*による慢性好酸球性白血


病の発症機構

好酸球系の前駆細胞(EoP)は、Gr1+IL-5Ra+の表面形質を有し、骨髄球系共通前駆細胞(CMP)、顆粒球単球系前駆細胞(GMP)から産生される。F/Pおよび慢性骨髓単球性白血病(CMML)の原因遺伝子TEL-PDGFRB(T/P)を造血幹細胞を含むマウスKSL細胞、および、他系統にコミットメントした、巨核球赤芽球系前駆細胞(MEP)、リンパ系共通前駆細胞に導入し、EoPの発生に及ぼす影響について検討を行った。

F/PをKSL細胞に導入すると、T/P導入時と比較してEoPの発生が強く促進された。



また、MEPに導入した場合には、赤芽球分化が阻害され、系統転換によりEoPが発生した。



CLPに導入した場合にも、Bリンパ球の発生が阻害され、系統転換によりEoPが発生した。各種阻害薬を用いた結果、F/PによるEoPの誘導には、Ras/MAPK、p38MAPKが関与していると考えられた。さらに、F/PはGATA-2、CEBPAの発現を誘導することも明らかとなった。


(J Biol Chem 284, 7719-7732, 2009 文献6)

3. BCR-ABLによる赤血球造血の抑制機序


慢性骨髓性白血病(CML)の原因遺伝子BCR-ABL、真性多血症(PV)の原因遺伝子JAK2V617Fは共に恒常的活性型チロシンキナーゼとして機能しRas/MAPK、STAT、PI3-Kという共通した下流分子を活性化するがBCR-ABLは貧血、JAK2V617Fは多血症と異な

った病態を引き起こす。

BCR-ABL、JAK2V617FをKSL細胞に導入すると、BCR-ABLは顆粒球系前駆細胞を有意に増加させたが、赤芽球系前駆細胞を減少させた。一方、JAK2V617Fはこれらの前駆細胞数にはほとんど影響しなかった。




BCR-ABLの下流分子のうち、Rasの活性化変異体(N-RasE12)、STAT5の活性化変異体(1*6STAT5A)、PI3Kの活性化変異体(p110CAAX)をそれぞれKSL細胞に導入すると、いずれの変異体も顆粒球系前駆細胞を有意に増加させた。一方、赤芽球系前駆細胞は1*6STAT5Aとp110CAAXによって増加したがN-RasE12によって減少した。これらの結果からBCR-ABL下流のRasの経路が赤血球造血を



抑制すると考えられた。

Rasの経路が顆粒球系細胞の増殖を促進するのに対し、赤血球造血を抑制する機構として、赤血球特異的転写因子GATA-1がRasの下流のMEK1と直接結合し、Rasの増殖シグナルを阻害することを見出した。

N-RasE12を導入したKSL細胞では、細胞増殖を抑制する分子としてp16^{INK4A}、p19^{ARF}、p21^{WAF1}の発現誘導がみられたが、p16^{INK4A}、p19^{ARF}と共に欠損するマウスのKSL細胞を用いてもN-RasE12による赤血球造血の抑制は回避されず、p21^{WAF1}を欠損するKSL細胞では赤芽球系前駆細胞の比率は減少するものの、絶対数は逆に増加した。



これらの結果からBCR-ABLはp21^{WAF1}を介して赤血球造血を抑制すると考えられた。また、p21^{WAF1}はp53の標的分子であるが、p53欠損KSL細胞でもN-RasE12による赤血球造血の抑制がみられたことからBCR-ABLによるp21^{WAF1}の発現誘導はp53非依存性であることが示された。

(J Biol Chem 285:31774-31782, 文献5)

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文] (計 13 件)

- ① Chihara T, Wada N, Matsumura I, et al. (他10名、9番目) Frequency of intravascular large B-cell lymphoma in Japan: Study of the Osaka Lymphoma Study Group. J Hematol Oncol. 査読有、2011, online publication.
- ② Shibata M, Ezoe S, Matsumura I, et al. (他8名、10番目) Predictability of the response to tyrosine kinase inhibitors via in vitro analysis of Bcr-Ab1 phosphorylation. Leuk Res. 査読有、2011, online publication.
- ③ Fujita J, Mizuki M, Matsumura I, et al. (他7名、9番目) Myeloid neoplasm-related gene abnormalities differentially affect dendritic cell differentiation from murine hematopoietic stem/progenitor cells. Immunol Lett. 査読有、136:61-73, 2011.
- ④ Maeda Y, Sasakawa A, Matsumura I, et al. (他6名、9番目) Senescence induction therapy for the treatment of adult T-cell leukemia. Leuk Lymphoma. 査読有、52:150-152, 2011.
- ⑤ Tokunaga M, Ezoe S, Matsumura I, et al. (他8名中、10番目) BCR-ABL but not JAK2

V617F inhibits erythropoiesis through the Ras signal by inducing p21CIP1/WAF1. J Biol Chem. 査読有、285:31774-31782, 2010.

⑥ Fukushima K, Matsumura I, Ezoe S, et al. (他13名中、2番目) FIP1L1-PDGFRalpha imposes eosinophil lineage commitment on hematopoietic stem/progenitor cells. J Biol Chem. 査読有、284:7719-7732, 2009.

⑦ Satoh Y, Matsumura I, Tanaka H, et al. (他9名中、2番目) AML1/RUNX1 works as a negative regulator of c-Mpl in hematopoietic stem cells. J Biol Chem. 査読有、283:30045-30056, 2008.

⑧ Shizusawa T, Shibayama H, Matsumura I, et al. (他11名他、6番目) The expression of anamorsin in diffuse large B cell lymphoma: possible prognostic biomarker for low IPI patients. Leuk Lymphoma. 査読有、49:113-121, 2008.

⑨ Sasaki H, Hayakawa J, Matsumura I, et al. (他10名他、9番目) Difference between genomic actions of estrogen versus raloxifene in human ovarian cancer cell lines. Oncogene. 査読有、27:2737-2745, 2008.

⑩ Matsumura I, Mizuki M, Kanakura Y. Roles for deregulated receptor tyrosine kinases and their downstream signaling molecules in hematologic malignancies. Cancer Sci. 査読有、99:479-485, 2008.
(他 3 件)

[学会発表] (計 23 件)

- ① Tokunaga M, Matsumura I, et al. BCR-ABL suppresses erythropoiesis thruogh Ras signaling by the Induction of P21clp1/waf1
第 72 回 日本血液学会学術集会
2010. 9. 24
- ② Tanaka H, Matsumura I, et al. Iron-overload impairs normal hematopoiesis and would contribute to disease progression of MDS
第 72 回 日本血液学会学術集会
2010. 9. 24

- ③ 松村 到
慢性骨髄性白血病と第二世代 ABL チロシンキナーゼ阻害剤
第 72 回 日本血液学会学術集会
2010. 9. 24
- ④ 松村 到、田中宏和
AML 幹細胞の特性解析
第 69 回 日本癌学会学術集会
2010. 9. 22
- ⑤ 松村 到
急性骨髄性白血病の治療
第 71 回日本血液学会総会 教育講演
2009. 10. 23
- ⑥ Itaru Matsumura
Effects of iron overload on hematopoiesis
The 8th International Porphyrin-Heme Symposium 2008. 10. 16
(他 17 件)

[図書] (計 14 件)

- ① 松村 到、医薬ジャーナル社、WH 血液腫瘍分類～WHO 分類 2008 をうまく活用するため～、(2010)、587、(38-45)
② 松村 到、中外医学社、Annual Review 血液、(2010)、229、(107-113)
(他 12 件)

6. 研究組織

(1) 研究代表者

松村 到 (MATSUMURA ITARU)
近畿大学・医学部・教授
研究者番号 : 00294083

(2) 研究分担者

金倉 譲 (KANAKURA YUZURU)
大阪大学・大学院医学系研究科・教授
研究者番号 : 20177489
(H21まで分担者として参画)
水木 満佐央 (MIZUKI MASAO)
大阪大学・附属病院・准教授
研究者番号 : 80283761
(H21まで分担者として参画)
織谷 健司 (ORITANI KENJI)
大阪大学・大学院医学系研究科・准教授
研究者番号 : 70324762
(H21まで分担者として参画)
柴山 浩彦 (SHIBAYAMA HIROHIKO)
大阪大学・大学院医学系研究科・講師
研究者番号 : 60346202
(H21まで分担者として参画)
芦田 隆司 (ASHIDA TAKASHI)
近畿大学・医学部附属病院・准教授

研究者番号 : 30211006

(H22 から分担者として参画)

辰巳 陽一 (TATSUMI YOICHI)

近畿大学・医学部附属病院・准教授

研究者番号 : 60236552

(H22 から分担者として参画)

嶋田 高広 (SHIMADA TAKAHIRO)

近畿大学・医学部・講師

研究者番号 : 90319674

(H22 から分担者として参画)

(3) 連携研究者

なし